**Anlage 2**

## Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

### 1. Cumlosen-Wittenberge-Rühstädter Elbniederung

Name:
**Cumlosen-Wittenberge-Rühstädter Elbniederung**
*(Zusammenlegung der Gebiete „Elbdeichhinterland“, DE 3036-302; „Elbdeichvorland“, DE 3036-304; „Krähenfuß“, DE 3036-303; „Lennewitzer Eichen“, DE 3137-301 und von Teilflächen des Gebietes „Elbe“, DE 2935-306)*

(das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)

| Landes-Nr.: | EU-Nr.: | Größe: |
|---|---|---|
| 106 | DE 3036-302 | rund 4 133 ha |

Landkreis: Prignitz
Gemeinden: Bad Wilsnack, Cumlosen, Legde/Quitzöbel, Rühstädt, Wittenberge

Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse
(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)

- Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) (2330),
- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),
- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),
- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. (3270),
- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),
- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440),
- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),
- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160),
- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190),
- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0).

Prioritäre natürliche Lebensraumtypen
(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)


- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).

Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)

- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus),
- Biber (Castor fiber),
- Fischotter (Lutra lutra),
- Kammmolch (Triturus cristatus),
- Rotbauchunke (Bombina bombina),
- Flussneunauge (Lampetra fluviatilis),
- Meerneunauge (Petromyzon marinus),
- Rapfen (Aspius aspius),
- Bitterling (Rhodeus amarus),
- Lachs (Salmo salar),

| |
|---|
| - Stromgründling (Romanogobio belingi),<br>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),<br>- Steinbeißer (Cobitis taenia).<br><br>Prioritäre Arten gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 11 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Eremit, Juchtenkäfer* (Osmoderma eremita).<br><br>Erhaltungsziele aus Schutzgebietsverordnung<br>Verordnung über das Naturschutzgebiet „Wittenberge-Rühstädter Elbniederung“ vom 6. Oktober 2004 (GVBl. II S. 827) |
| Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34 |


**Kartenskizze**



**2. Karthane**

<table>
<tr><td colspan="3">Name:<br>Karthane<br>(Zusammenlegung der Gebiete „Karthan“, DE 3037-302 und „Karthane“, DE 3037-303)<br><br>(das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)</td></tr>
<tr><td>Landes-Nr.:<br>351</td><td>EU-Nr.:<br>DE 3037-303</td><td>Größe:<br>rund 685 ha</td></tr>
<tr><td colspan="3">Landkreis: Prignitz<br>Gemeinden: Bad Wilsnack, Legde/Quitzöbel, Plattenburg, Rühstädt</td></tr>
<tr><td colspan="3">Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) (2330),<br>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),<br>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),<br>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),<br>- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110),<br>- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160),<br>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Moorwälder (91D0*),<br>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Biber (Castor fiber),<br>- Fischotter (Lutra lutra),<br>- Bitterling (Rhodeus amarus),<br>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),<br>- Steinbeißer (Cobitis taenia),<br>- Kleine Flussmuschel (Unio crassus).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 26, 27, 29, 30, 31, 32</td></tr>
</table>

**Kartenskizze**



### 3. Lenzener Elbniederung

Name:
**Lenzener Elbniederung**
*(Zusammenlegung der Gebiete „Elbaue Wootz“, DE 2934-303; „Elbdeichvorland Jagel“, DE 2935-304; „Gandower Schweineweide“; DE 2935-303; „Lenzen-Wustrower Elbniederung“, DE 2934-302; „Werder Besandten“, DE 2833-301; „Werder Kietz“, DE 2933-301; „Werder Mödlich“, DE 2934-304; „Werder Mödlich Ergänzung“, DE 2934-305 und von Teilflächen des Gebietes „Elbe“, DE 2935-306)*

| Landes-Nr.: | EU-Nr.: | Größe: |
|---|---|---|
| 112 | DE 2934-302 | rund 2 503 ha |

Landkreis: Prignitz
Gemeinden: Cumlosen, Lanz, Lenzen (Elbe), Lenzerwische

Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse
(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)

- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),
- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),
- Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p. (3270),
- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),
- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440),
- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),
- Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0).

Prioritäre natürliche Lebensraumtypen
(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)

- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).

Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)


- Biber (Castor fiber),
- Fischotter (Lutra lutra),
- Kammmolch (Triturus cristatus),
- Rotbauchunke (Bombina bombina),
- Flussneunauge (Lampetra fluviatilis),
- Meerneunauge (Petromyzon marinus),
- Rapfen (Aspius aspius),
- Bitterling (Rhodeus amarus),
- Lachs (Salmo salar),
- Stromgründling (Romanogobio belingi),
- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),
- Steinbeißer (Cobitis taenia).

Erhaltungsziele aus Schutzgebietsverordnung
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Gandower Schweineweide“ vom 20. Dezember 2002 (GVBl. II S. 70), die durch Artikel 4 der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (GVBl. II Nr. 70) geändert worden ist.

Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000

Blattnummern: 4, 10, 11, 12, 13, 18, 19


**Kartenskizze**



**4. Löcknitz**

| | | |
|---|---|---|
| Name:<br>**Löcknitz**<br>*(Zusammenlegung der Gebiete „Gadow“, DE 2935-305; „Mittlere und Obere Löcknitz“, DE 2836-301; „Untere Löcknitzniederung“, DE 2834-301 und „Untere Rhinowwiesen“, DE 2833-302)*<br><br>(das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen) | | |
| Landes-Nr.:<br>107 | EU-Nr.:<br>DE 2935-305 | Größe:<br>rund 1 547 ha |
| Landkreis: Prignitz<br>Gemeinden: Karstädt, Lanz, Lenzen (Elbe), Lenzerwische | | |
| Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),<br>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),<br>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),<br>- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440),<br>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),<br>- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110),<br>- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Großes Mausohr (Myotis myotis),<br>- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus),<br>- Biber (Castor fiber),<br>- Fischotter (Lutra lutra),<br>- Kammmolch (Triturus cristatus),<br>- Rotbauchunke (Bombina bombina),<br>- Bachneunauge (Lampetra planeri),<br>- Flussneunauge (Lampetra fluviatilis),<br>- Rapfen (Aspius aspius),<br>- Bitterling (Rhodeus amarus),<br>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),<br>- Steinbeißer (Cobitis taenia),<br>- Kleine Flussmuschel (Unio crassus). | | |
| Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | | |


**Kartenskizze**



**5. Mendeluch**

<table>
<tr><td colspan="3">Name:<br>Mendeluch</td></tr>
<tr><td>Landes-Nr.:<br>161</td><td>EU-Nr.:<br>DE 2937-301</td><td>Größe:<br>rund 23 ha</td></tr>
<tr><td colspan="3">Landkreis: Prignitz<br>Gemeinde: Perleberg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Dystrophe Seen und Teiche (3160),<br>- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Moorwälder (91D0*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummer: 22</td></tr>
</table>


**Kartenskizze**



**6. Mörickeluch**

<table>
<tr><td colspan="3">Name:<br>Mörickeluch</td></tr>
<tr><td>Landes-Nr.:<br>163</td><td>EU-Nr.:<br>DE 2937-302</td><td>Größe:<br>rund 14 ha</td></tr>
<tr><td colspan="3">Landkreis: Prignitz<br>Gemeinde: Perleberg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Moorwälder (91D0*).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummer: 22</td></tr>
</table>


**Kartenskizze**



**7. Quitzöbler Dünengebiet**

| | | |
|---|---|---|
| Name:<br>**Quitzöbler Dünengebiet** | | |
| Landes-Nr.:<br>353 | EU-Nr.:<br>DE 3138-303 | Größe:<br>rund 143 ha |
| Landkreis: Prignitz<br>Gemeinden: Legde/Quitzöbel, Plattenburg | | |
| Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) (2330),<br>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),<br>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),<br>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190),<br>- Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder (91T0).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Kammmolch (Triturus cristatus),<br>- Rotbauchunke (Bombina bombina). | | |
| Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 34, 35 | | |


**Kartenskizze**



**8. Rambower-Nausdorfer Moor**

<table>
<tr><td colspan="3">Name:<br>Rambower-Nausdorfer Moor<br>(Zusammenlegung der Gebiete „Nausdorfer Moor“, DE 2835-302 und „Rambower Moor“, DE 2835-301)</td></tr>
<tr><td>Landes-Nr.:<br>104</td><td>EU-Nr.:<br>DE 2835-301</td><td>Größe:<br>rund 605 ha</td></tr>
<tr><td colspan="3">Landkreis: Prignitz<br>Gemeinden: Karstädt, Lenzen (Elbe)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions (3150),<br>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),<br>- Kalkreiche Niedermoore (7230),<br>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden (6230*),<br>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus),<br>- Fischotter (Lutra lutra),<br>- Kammmolch (Triturus cristatus),<br>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),<br>- Großer Feuerfalter (Lycaena dispar),<br>- Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana),<br>- Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 2, 7, 8</td></tr>
</table>


**Kartenskizze**



**9. Silge**

<table>
<tr><td colspan="3">Name:<br>Silge<br>(das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen)</td></tr>
<tr><td>Landes-Nr.:<br>359</td><td>EU-Nr.:<br>DE 2936-302</td><td>Größe:<br>rund 1 506 ha</td></tr>
<tr><td colspan="3">Landkreis: Prignitz<br>Gemeinden: Karstädt, Lanz, Perleberg, Wittenberge</td></tr>
<tr><td colspan="3">Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),<br>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),<br>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),<br>- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110),<br>- Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (9130),<br>- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160),<br>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Moorwälder (91D0*),<br>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Großes Mausohr (Myotis myotis),<br>- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 14, 15, 16</td></tr>
</table>

**Kartenskizze**



**10. Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach**

| Name:<br>**Untere Stepenitzniederung und Jeetzbach** | | |
|---|---|---|
| Landes-Nr.:<br>352 | EU-Nr.:<br>DE 2937-303 | Größe:<br>rund 945 ha |
| Landkreis: Prignitz<br>Gemeinden: Breese, Perleberg, Plattenburg, Weisen, Wittenberge | | |
| Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland) (2310),<br>- Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Dünen im Binnenland) (2330),<br>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),<br>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),<br>- Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) (6440),<br>- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),<br>- Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110),<br>- Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli – Stellario-Carpinetum) (9160),<br>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).<br><br>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen<br>(§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).<br><br>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG<br>(§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)<br><br>- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus),<br>- Biber (Castor fiber),<br>- Fischotter (Lutra lutra),<br>- Kammmolch (Triturus cristatus),<br>- Bachneunauge (Lampetra planeri),<br>- Flussneunauge (Lampetra fluviatilis),<br>- Rapfen (Aspius aspius),<br>- Lachs (Salmo salar),<br>- Westgroppe (Cottus gobio),<br>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),<br>- Steinbeißer (Cobitis taenia). | | |
| Topografische Karte zur 17. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000<br><br>Blattnummern: 17, 21, 22 | | |

**Kartenskizze**

